

### **Descripción**

Desinfectante de uso veterinario en polvo. Amplio espectro microbiocida

### **Composición**

(1 kg contiene)

Peroximonosulfato de potasio ..... 550 g (p/p 55%)

Agentes de formulación ..... c.s.p. 1.000 g (p/p 45%)

### **Indicación**

Para la desinfección de objetos por eliminación de los patógenos sensibles al producto.

Bacterias: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.

Virus: Enfermedad vesicular porcina, virus de la enfermedad inflamatoria bursal (IBD), Virus de Influenza Aviar (VIA), Enfermedades víricas del pie y boca (FMD).

Desinfección de establos y equipos de granjas.

### **Dosis y administración**

Utilice este producto después de diluirlo: la dilución sugerida está en un rango de 1:200 (1 g de producto en 200 litros de agua) hasta 1:1000 (1 g de producto en 1.000 litros de agua).

El producto puede aplicarse por pulverización, mojado o mediante un trapo sobre el objeto de desinfección.

Una vez aplicado el producto, debe dejarse actuar durante 10 minutos, verificando que las superficies tratadas se hayan mantenido visiblemente mojadas durante ese período; luego enjuagar con agua potable.

### **Precauciones y advertencias**

Lea cuidadosamente estas instrucciones (especialmente las precauciones) antes del uso.

Respete las dosis específicas y la administración para evitar accidentes médicos, pérdidas económicas causadas por abuso o mal uso, o en orden a prevenir la contaminación ambiental y el deterioro del efecto desinfectante.

Use el producto de acuerdo a la prescripción y/o instrucción veterinaria.

No utilice otras drogas con los mismos ingredientes de composición de este producto al mismo tiempo, porque puede provocar accidentes médicos y pérdidas económicas por mal uso o abuso.

No use este producto cuando los animales pueden entrar en shock o tengan una reacción de hipersensibilidad al producto.

Cuando diluya el producto, use envases plásticos o de acero inoxidable, porque los envases metálicos o galvanizados con hierro, bronce, zinc, pueden ser corroídos.

Cumpla con la tasa de dilución recomendada en "Dosis y Administración" en orden a prevenir la contaminación ambiental y el deterioro del efecto desinfectante.

No use el producto en combinación con otros medicamentos, así como tampoco con sustancias alcalinas. De lo contrario, podría causar algún problema en el efecto medicinal y/o seguridad.

## **Desinfecsol**

Almacenar este producto diluido puede reducir el efecto medicinal; diluir el producto en cada uso. Descartar el producto sobrante, una vez que fuera diluido y preparado para el uso.

Si se utiliza en la desinfección de ordeñadoras, enjuáguela exhaustivamente con agua para prevenir cualquier inclusión de la droga en la leche.

Los animales pueden retornar a las instalaciones, y los equipos pueden volver a utilizarse, luego que el producto aplicado haya sido absorbido o se hayan secado las superficies tratadas.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.

Respetar el método de almacenamiento establecido, para prevenir cualquier cambio en la seguridad y eficacia.

No utilice el producto vencido, descártelo.

Registre exhaustivamente el uso del producto, para prevenir el mal uso y abuso y la aparición de tolerancia.

Descartar el envase usado y/o los materiales de empaque, y no los utilice para otros fines.

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

No subdivida el producto en otros envases o materiales de empaque en orden a prevenir el mal uso o deterioro.

No coma ni alimente a los animales con el producto, podría peligrar su salud.

Al utilizar el producto, evite cualquier contacto directo utilizando accesorios de seguridad, por ej. guantes, máscara, anteojos de seguridad, y ropa de seguridad. Luego del uso, lávese.

Evite cualquier contacto directo con los ojos y piel, incluyendo la contaminación de alimentos, productos, ropas, juguetes, etc.

En caso de que la piel o los ojos tomen contacto con el producto, lávelos inmediatamente con agua; si tiene síntomas anormales consulte inmediatamente al médico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

### **Almacenamiento**

Almacenar en su envase original bien cerrado, a temperatura ambiente (hasta 25°C), en un lugar seco, ventilado y evitando la luz solar directa.

Plazo de validez: 3 años desde la fecha de fabricación.

Una vez que el producto ha sido diluido con agua para su uso, debe ser utilizado dentro de los 7 días desde que fue preparado.

Distribuido y comercializado por: ENSOL S.A. Juana Manso 1700, Piso 8, Oficinas C y D, Edificio Esmeralda, Complejo Zencity, (C1107CHH). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**Presentación:** 5Kg

**Firma Inscripta** N° 12181

**Certificado de inscripción de producto** N° 22-137